

コロラド州：小麦作柄と気象状況

2010 年 5 月 9 日現在

概況 コロラド州の 2010 年 5 月 9 日に終わる 1 週間の気象は、平年以下の気温の乾燥気象であった。1 週間の州平均稼動日数は 6.3 日(前週:5.0 日)であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は前週より “ Surplus ” が減少する一方 “ Short ” の圃場が増えたが、水分状態は昨年より良い状態が続いた。冬小麦の生育は低温が続き昨年及び 5 年平均より遅れており、全体の 69% (昨年同期:76%、5 年平均:77%) が節間成長となり、2% (昨年:9%、5 年平均:11%) が出穂した。冬小麦の作柄は前週より “ Excellent ” が多少減少したが、全体として昨年より良好な状態であった。

土壌水分(*)

(%)		Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	1	10	85	4
	Last week	1	5	87	7
	Last year	8	24	62	6
Subsoil	This week	1	8	89	2
	Last week	1	6	88	5
	Last year	13	33	51	3

冬小麦の生育状況(*)

	This week	Last week	Last year	5-Yr Avg.
Jointed (%)	69	55	76	77
Headed (%)	2	1	9	13

冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	0	3	15	59	23
Last week	0	2	13	58	27
Last year	1	7	20	52	20

(*) Source : National Agricultural Statistics Service, USDA-Colorado Field Office.5-yr avg. means average of 2005,2006,2007,2008 and 2009.

以上