

アイダホ州：小麦作柄と気象状況

2010 年 5 月 23 日現在

概況 アイダホ州の 2010 年 5 月 23 日に終わる 1 週間の気象概況は、各地で降雨を伴う低温気象であった。N 地区の最高気温は 74～87 度 F (Lewiston) となったが、最低気温が低く平均気温は平年を 1～3 度 F 下回った。SW 地区も同様に最低気温は 32～34 度 F と低く、平均気温は平年を 5～8 度 F 下回った。1 週間の降水量は N 地区では 0.49～1.10 インチ、SW 地区では 0.28～0.91 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.4 日（前週：5.6 日）であった。Topsoil の土壌水分は前週より“Short”と“Surplus”が減り“Adequate”が増えた。冬小麦の 63%が節間成長期、8%が穂孕み期そして 1%が出穂した。冬小麦の生育は低温の為昨年より遅れていた。冬小麦の作柄は前週より“Excellent”が減りその分“Good”の評価が増加した。春小麦の播種は概ね昨年並みの進捗であり、全州の 96%（昨年：95%、5 年平均：95%）にて完了したが、出芽は低温で遅れ気味であり全州平均では 73%（昨年：76%、5 年平均：79%）の出芽であった。地区的に見ると N 地区では播種圃場の 85%が出芽し、昨年より早い進展であった。春小麦の作柄は前週より改善し 90%が“Good”以上であった。

土壌水分 (*)

(%)		Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	10	82	8
	Last week	0	15	71	14

冬小麦の生育状況 (*)

(%)		Jointed	Booted	Headed
This week		63	8	1

冬小麦の生育状況 (*)

(%)		North	Southwest	South-Central	East	State Ave.
Headed	2010	--	13	--	--	1
	Last year	--	11	3	--	2
	Ave.	1	22	12	--	4

冬小麦の作柄状況 (*)

(%)		Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week		0	0	9	83	8
Last week		0	0	9	78	13

春小麦の生育状況 (*)

(%)		North	Southwest	South-Central	East	State Ave.
Planted	2010	96	100	100	95	96
	Last year	94	100	100	92	95
	Ave.	98	100	100	92	95
2010		85	100	94	63	73

ご質問又はご意見は、OMIC USA Inc.小川正晃 ogawa.max@omicnet.com までお願い致します。

Emerged	Last year	48	100	95	79	76
	Ave.	68	100	97	77	79

*) Source : National Agricultural Statistics Service, USDA-Idaho Field Office. Ave. means average of 2005,2006,2007,2008 and 2009 crop years

以上

ご質問又はご意見は、OMIC USA Inc.小川正晃 ogawa.max@omicnet.comまでお願い致します。