

アイダホ州：小麦作柄と気象状況

2011 年 5 月 15 日現在

概況 アイダホ州の 2011 年 5 月 15 日に終わる 1 週間の気象は、度々降雨を伴う温暖な気象となった。N 地区の最高気温は 78～80 度 F となり、今年最も暖かい気象となり、平均気温は平年を 2～9 度 F 上回った。N 地区の 1 週間の降水量は 0.42～1.26 インチであった。SW 地区でも気温が上がり、最高気温は 78～86 度 F となり、平均気温は平年を 2～9 度 F 上回った。同地区の 1 週間の降水量は 0.00～1.26 インチであった。各地の 3 月 1 日からの積算降水量は平年より 20～60%多い降水量となっていた。1 週間の州平均農作業稼働日数は 4.8 日（前週：5.5 日）であった。Topsoil の土壌水分は降雨の為 “Surplus” が増加し、全圃場の 30%が “Surplus” となった。2011 年産冬小麦は全体の 42%が節間成長期となり、全体の 4%が穂孕み期となった。生育は昨年より多少早い、5 年平均より遅れていた。冬小麦の作柄は気温の上昇にて多少前週より改善したが、昨年の作柄には及ばなかった。春小麦の播種は全州の 78%にて完了したが、平年より遅れていた。特に N 地区での遅れが目立った。出芽もこれまでの低温気象の為遅れていた。

2011 年 5 月 15 日現在：土壌水分（*）

（ % ）		Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	0	70	30
	Last week	0	3	77	20

2011 年 5 月 15 日現在：冬小麦の生育状況(*)

（ % ）	This week	Last year	Ave.
Jointed	42	40	45
Boot	4	2	8

2011 年 5 月 15 現在：冬小麦の作柄状況（*）

（ % ）	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	1	4	11	73	11
Last week	1	3	13	72	11
Last year	0	0	9	78	13
Irrigation water	0	0	0	53	47

2011 年 5 月 15 日現在：春小麦の生育状況（*）

（ % ）		North	Southwest	South-Central	East	State Ave.
Planted	2011	52	100	97	82	78
	2010	90	100	100	88	90
	Ave.	91	100	100	87	91
Emerged	2011	30	100	92	35	42
	2010	73	99	92	50	61
	Ave.	44	97	93	56	61

*) Source: National Agricultural Statistics Service, USDA-Idaho Field Office. Ave. means average of 2006,2007,2008,2009 and 2010 crop years

USDA の 2011 年 5 月 1 日付け（5 月 11 日発表）の 2011 年産冬小麦の生産量予想では、アイ

ダホ州の 2011 年産冬小麦の作付面積は 2010 年産の作付面積より 12%増の 840,000 acres であり、収穫予想面積は 790,000 acres(昨年：710,000 acres)であった。単収は春先からの天候不順で昨年より 3.0 bu/acre 低い 79.0 bu/acre であり、生産量は昨年の 7%増の 62,410,000 bushels (約 170 万トン)と予想された。

USDA2011 年 5 月 11 日発表：2011 年産冬小麦の収穫予想 (*)

Crop	Area Planted 1,000 acres		Area harvested 1,000 acres		Yield/acre bushel		Production 1,000 bushel		
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2009	2010	2011
Idaho	750	840	710	790	82.0	79.0	56,700	58,220	62,410
USA	37,335	40,990	31,749	32,039	46.8	44.5	1,524,608	1,485,236	1,424,357

(*) Source: National Agricultural Statistics Service, U.S.D.A

以上