

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2010 年 6 月 27 日現在

概況 カンサス州の 2010 年 6 月 27 日に終わる 1 週間の気象は、全州少雨の高温気象となった。西部 3 地区の最高気温は 101～102 度 F となり、降雨は少なく 0.04～0.89 (SW 地区) インチであった。中央から東部に掛けての最高気温は 93～96 度 F 程度であった。1 週間の降水量は 0.00～0.90 インチ (NE 地区) であった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.8 日 (前週：3.7 日) となった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は “Surplus” が大幅に減少し “Adequate” が増えたが、同時に “Short” も増加した。冬小麦は気温の上昇と乾燥気象により急速に完熟し、全体の 55% が収穫された。登熟は前週まで例年より遅れていたが、気温の上昇により収穫は昨年並びに 5 年平均より早まった。作柄評価は前週から大きな変化は無かった。現在までの単位収量は平均 50.0 bu/acre、容積重は 61 lbs/bu、蛋白質は例年より低目で 11.0～13.5% と報告された。

2010 年 6 月 1 日付け USDA の 2010 年産冬小麦の生産量予想では、カンサス州産冬小麦の単位収量は 5 月 1 日付け予想より 1.0 bushel/acre 増え 43.0 bushels/acre となったが、収穫面積が昨年より 7% 少なくなっており、同州の 2010 年産冬小麦の生産量は昨年比 95.4% の 352,600,000 bushels (約 960 万トン) と予想された。

土壌水分 (*)

(%)		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	0	3	14	0	2	2	0	1	3	3	2	1
	Short	5	20	30	1	18	17	0	12	16	14	5	13
	Adequate	78	77	55	77	75	76	86	72	74	74	71	78
	Surplus	17	0	1	22	5	5	14	11	9	9	22	8
Subsoil	Very short	0	1	15	0	2	1	0	0	1	3	3	1
	Short	2	7	23	1	15	11	0	5	7	8	5	12
	Adequate	88	91	61	86	77	85	91	87	85	83	77	82
	Surplus	10	1	1	13	6	3	9	8	7	6	15	5

冬小麦の生育状況 (*)

(%)	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	5-Yr.
Turned color	93	95	100	100	100	100	100	100	100	984	94	99	99
Matured	24	74	96	75	100	100	84	89	95	84	58	81	87
Harvest	1	19	60	34	84	88	22	65	79	55	10	41	52

冬小麦の作柄状況 (*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	3	10	31	46	10
Last week	3	9	31	47	10

(*)Source: National Agricultural Statistic Service, Kansas Field Office. Week means last week, year means last year, 5-Yr means average of 2005,2006,2007,2008 & 2009 crop years.

2010 年 6 月 1 日付け USDA 冬小麦生産量予想

State	Area Harvested 1,000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1,000 bushels	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010
				May 1	June 1		
Kansas	8,800	8,200	42.0	42.0	43.0	369,600	352,600
USA	34,485	31,786	44.2	45.9	46.6	1,522,718	1,482,364

以上

ご質問又はご意見は、OMIC USA Inc.小川正晃 ogawa.max@omicnet.com までお願い致します。

© Copyright 2002-2010 OMIC USA Inc. All rights reserved.