

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2010 年 11 月 21 日現在

概況 カンサス州の 11 月 21 日に終わる 1 週間の気象は、州中央部から東部では降雨を伴い、西部 3 地区では殆ど降雨は無く、全州にて略平年並みか多少平年より高目の気温の気象であった。NC 地区の最高気温は 53～57 度 F であり、他の地区より低目であった。他の地区の最高気温は 55～65 度 F となり、平均気温は平年を 1～3 度 F 上回った。1 週間の降水量は中央部から東部では 0.20～0.37 インチであったが、西部 3 地区では 0.01～0.14 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 3.8 日（前週：4.7 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は、西部 3 地区では前週より減少したが、州平均の土壌水分は前週より多少改善した。2011 年産冬小麦は、播種圃場の 92%（昨年：87%、5 年平均：94%）にて出芽した。出芽は昨年より多少早い進捗であったが、5 年平均より多少遅れていた。冬小麦の作柄は前週より多少評価が上がったが、昨年の作柄より可也低い評価であった。

土壌水分 (*)

	(%)	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	35	53	44	4	4	1	1	0	1	14	16	0
	Short	44	35	43	14	22	7	2	11	11	20	25	3
	Adequate	20	12	13	79	65	86	93	87	73	61	56	76
	Surplus	1	0	0	3	9	6	4	2	15	5	3	21
Subsoil	Very short	35	35	49	7	10	3	1	1	3	15	15	1
	Short	41	50	35	24	34	21	11	20	17	27	33	7
	Adequate	24	15	16	67	54	76	88	78	78	57	51	79
	Surplus	0	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	13

冬小麦の生育状況 (*)

(%)	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	5-Yr.
Emerged	94	86	93	93	95	94	98	94	96	92	89	87	94

冬小麦の作柄状況 (*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	8	18	38	32	4
Last week	8	19	39	31	3
Last year	1	3	24	57	15

(*)Source: National Agricultural Statistic Service, Kansas Field Office. Week means last week, year means last year, 5-Yr means average of 2006,2007,2008,2009 & 2010 crop years.

以上