

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2010 年 11 月 28 日現在

概況 カンサス州の 11 月 28 日に終わる 1 週間の気象は、州 SE 地区を除き乾燥した気象であった。気温は地区により差があり、NW 地区の最高気温は 59～61 度 F、最低気温は 7～12 度 F と低く、平均気温は平年を 3～6 度 F 下回った。西部 3 地区及び中央部の最低気温は極めて低く、平均気温は平年を 1～6 度 F 下回った。南部 3 地区の最高気温は 70～75 度 F であり、平均気温は平年を上回った。降雨は SE 地区にて 0.39～0.84 インチを記録した観測所があったが、州の殆どの観測所にて降水は記録されなかった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.4 日（前週：3.8 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は、西部及び中央部では前週より更に減少した。2011 年産冬小麦は、播種圃場の 95%（昨年：91%、5 年平均：97%）にて出芽した。冬小麦の作柄は前週より多少評価が上がったが、昨年の作柄より可也低い評価であった。低温と土壌の乾燥のため小麦の作柄は例年より良くないとの報告であった。

土壌水分 (*)

(%)		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	38	58	34	6	3	1	1	1	3	14	14	1
	Short	42	30	49	22	23	14	4	15	17	23	20	4
	Adequate	19	12	17	70	68	83	93	83	69	60	61	81
	Surplus	1	0	0	2	6	2	2	1	11	3	5	14
Subsoil	Very short	36	36	44	7	9	3	1	1	5	14	15	1
	Short	42	51	42	26	30	26	12	22	20	29	27	6
	Adequate	22	13	14	65	59	71	87	77	73	56	57	83
	Surplus	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	1	10

冬小麦の生育状況 (*)

(%)	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	5-Yr.
Emerged	95	88	96	96	98	96	99	97	98	95	92	91	97

冬小麦の作柄状況 (*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	8	17	38	33	4
Last week	8	18	38	32	4
Last year	1	4	27	53	15

(*)Source: National Agricultural Statistic Service, Kansas Field Office. Week means last week, year means last year, 5-Yr means average of 2006,2007,2008,2009 & 2010 crop years.

以上