

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2011 年 10 月 2 日現在(第 1 回)

概況 カンサス州の 2011 年 10 月 2 日に終わる 1 週間は、夜間の気温は下がるが日中の気温は温暖であり、全州にて降雨の少ない乾燥気象であった。各地の最高気温は概ね 90 度 F を超え SC 地区では 92～98 度 F であった。NE 地区の最高気温は他地区より低目であり 85～90 度 F であった。最低気温は 32～41 度 F であり、平均気温は西部 3 地区では平年を 2～6 度 F 上回り、他地区では平年を 1～4 度 F 下回った。1 週間の降水量は全州に於いて 0.00 インチと報告された。1 週間の州平均農作業稼働日数は 6.9 日（前週：6.3 日）であった。Topsoil の土壌水分が “Adequate” 50%以上の地区は NE 地区のみであった。全州の圃場の Topsoil の水分は、75%が “Short” 以下の状態であった。2012 年産冬小麦の播種は 9 月 12 日に終わる週に始まり、9 月 12 日現在全州の 3%（去年同期：4%）にて播種が完了していた。10 月 2 日現在播種は全州の 43%にて完了し、13%の圃場にて出芽していた。昨年より多少早めの播種と出芽状態であったが、土壌水分は不足していた。今後の降雨が必要な状態であった。

2011 年 10 月 2 日現在：土壌水分(*)

		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	12	30	86	13	46	68	10	40	51	43	38	10
	Short	45	39	13	42	34	26	22	43	33	32	28	23
	Adequate	43	31	1	45	20	6	67	17	16	26	34	64
	Surplus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Subsoil	Very short	17	29	88	9	47	78	7	51	59	46	45	9
	Short	39	40	12	37	38	20	24	38	31	30	28	26
	Adequate	44	31	0	54	15	2	68	11	10	24	27	64
	Surplus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

2011 年 10 月 2 日現在：冬小麦の生育状況(*)

	NW	WC	CW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave
Planted (%)	75	65	38	35	43	27	19	22	12	43	20	42	47
Emerged (%)	31	32	13	5	5	6	4	1	1	13	4	11	18

Ave(2006～2010)

2011 年 10 月 2 日現在：冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	NA	NA	NA	NA	NA
Last week	NA	NA	NA	NA	NA

*) Source: National Agricultural Statistic Service, USDA-Kansas Field Office. 5-yr average means average of 2006,2007,2008,2009 and 2010 crop years

以上