

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2011 年 10 月 9 日現在

概況 カンサス州の 2011 年 10 月 9 日に終わる 1 週間気象は、風を伴った温暖な気象で始まりその後降雨を伴う気象となった。7 週間目の久々の降雨であったが、SE 地区では降水は殆ど記録されなかった。1 週間の降水量の多かったのは SW 地区であり、1.78～2.58 インチ、続いて WC 地区にて 0.77～2.33 インチが記録された。乾燥していた SC 地区では 0.65～1.52 インチの降水量があった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.9 日（前週：6.9 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は各地で改善したが、州平均の土壌水分は昨年より未だかなり低い状態であった。特に Subsoil の土壌水分が SW 及び SC 地区で乾燥していた。2012 年産冬小麦の播種は東部 3 地区では他地区より遅れているが、州平均では 69%（去年同期：67%、5 年平均：68%）の圃場にて播種が終わり、35%の圃場にて出芽した。昨年より土壌が乾燥している状態であるが、出芽は昨年より順調であった。

2011 年 10 月 9 日現在：土壌水分(*)

		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	0	11	74	13	30	47	14	39	49	34	43	13
	Short	16	24	21	25	37	17	30	44	34	28	32	32
	Adequate	71	59	5	61	33	34	55	17	17	36	25	54
	Surplus	13	6	0	1	0	2	1	0	0	2	0	1
Subsoil	Very short	9	21	85	8	45	63	8	56	55	43	46	12
	Short	25	38	12	26	39	26	31	35	36	29	30	29
	Adequate	61	40	3	65	16	11	60	9	9	27	24	59
	Surplus	5	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

2011 年 10 月 9 日現在：冬小麦の生育状況(*)

	NW	WC	CW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave
Planted (%)	89	83	59	72	75	59	47	45	23	69	43	67	68
Emerged (%)	59	57	27	32	24	33	13	13	5	35	13	28	34

Ave(2006～2010)

2011 年 10 月 9 日現在：冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	NA	NA	NA	NA	NA
Last week	NA	NA	NA	NA	NA

*) Source: National Agricultural Statistic Service, USDA-Kansas Field Office. 5-yr average means average of 2006,2007,2008,2009 and 2010 crop years

以上