

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2011 年 10 月 30 日現在

概況 カンサス州の 2011 年 10 月 30 日に終わる 1 週間気象は、平年より高目の気温の乾燥気象となった。全州の最高気温は 81～86 度 F となり各地の平均気温は平年を 2～8 度 F 上回った。降雨は殆ど無く、1 週間の降水量は NC 地区では全観測所にて 0.00 インチであった。最も雨量の多かったのは NW 地区であり、降水量は 0.12～0.32 インチであった。その他の地区では 0.00～0.09 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 6.7 日（前週：6.0 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は NW 地区で多少改善したが、その他の地区では乾燥が進んだ。特に SW、EC、SE 地区の圃場は乾燥が激しかった。2012 年産冬小麦の播種は州東部を残し概ね完了し、全州平均では昨年同期と同じ 96%の圃場にて完了していた。出芽は乾燥している地区では遅れ気味であったが、州平均で 81%（昨年同期：73%、5 年平均：75%）の圃場にて出芽していた。出芽は昨年及び 5 年平均より早まった。出芽後の小麦の作柄は、“Good” が 40%となり前週並びに昨年同期より多少良い評価であった。

2011 年 10 月 30 日現在：土壌水分(*)

		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	1	11	66	9	31	38	21	50	55	35	32	20
	Short	18	27	24	46	41	35	41	41	38	35	33	37
	Adequate	80	60	10	43	28	27	38	9	7	29	34	43
	Surplus	1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Subsoil	Very short	5	20	79	9	43	61	17	59	58	43	44	15
	Short	20	35	19	37	43	31	34	35	33	32	31	35
	Adequate	71	44	2	54	14	8	49	6	9	25	25	50
	Surplus	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011 年 10 月 30 日現在：冬小麦の生育状況(*)

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave
Planted (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96	92	96	91
Emerged (%)	94	90	69	82	89	75	58	58	55	81	70	73	75

Ave(2006～2010)

2011 年 10 月 30 日現在：冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	3	9	44	40	4
Last week	3	9	45	39	4
Last year	4	15	43	35	3

*) Source: National Agricultural Statistic Service, USDA-Kansas Field Office. 5-yr average means average of 2007,2008,2009,2010 and 2011 crop years

以上