

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2011 年 11 月 20 日現在

概況 カンサス州の 2011 年 11 月 20 日に終わる 1 週間気象は、平年より高目の気温で全州にて少雨（降雪を含む）の乾燥した気象であった。降雨又は降雪が記録されたのは NW 及び NCN 地区であり、降水量は 0.01～0.09 インチであった。最高気温は 64～71 度 F、最低気温は 13～26 度 F であり、平均気温は平年を 1～5 度 F 上回った。特に東部 3 地区では気温が他地区より高目で、降雨は全く記録されなかった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.9 日（前週：4.1 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は SW 地区では引き続き乾燥圃場が 89%を占めていた。2012 年産冬小麦は全州の 96%の圃場にて出芽し、出芽は昨年並びに 5 年平均より早い進展であった。出芽後の冬小麦の作柄は前週より多少改善し、昨年同期より良い評価であった。

2011 年 11 月 20 日現在：土壌水分(*)

		NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Topsoil	Very short	2	12	62	1	13	26	3	20	16	19	18	14
	Short	17	29	27	20	29	27	12	31	30	25	23	21
	Adequate	79	58	11	76	52	46	80	49	49	53	55	60
	Surplus	2	1	0	3	6	1	5	0	5	3	4	5
Subsoil	Very short	7	18	75	9	29	53	6	34	39	32	33	15
	Short	17	41	20	33	40	35	25	42	30	32	31	28
	Adequate	75	39	5	57	25	12	67	24	31	35	35	56
	Surplus	1	1	0	1	6	0	2	0	0	1	1	1

Week means “last week”. Year means “Last year”.

2011 年 11 月 20 日現在：冬小麦の生育状況(*)

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave*
Emerged (%)	99	98	85	99	100	99	89	93	94	96	94	92	92

2011 年 11 月 20 日現在：冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	3	8	42	41	6
Last week	3	9	42	40	6
Last year	8	18	38	32	4

*) Source: National Agricultural Statistic Service, USDA-Kansas Field Office. 5-yr average means average of 2007,2008,2009,2010 and 2011 crop years

以上