

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2002 年 10 月 8 日

2002 年 10 月 6 日現在：

10 月 6 日までの 1 週間は、全州各地で降水があり州平均農作業可能日数は 3.9 日であった。州西部地方でも降水量（1 週間）0.58～1.16 インチを記録し、NC では 2.85 インチに達した。この降水は土壌水分を改善し、秋蒔きの小麦にとって極めて有効であった。

2003 年産冬小麦の播種は好天に恵まれ順調に進捗し、10 月 6 日日現在、67%の圃場で終了（昨年同期：77%、平年：59%）した。37%の圃場で出芽している（昨年同期：41%、平年：29%）。

土壌水分状況：

Topsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Very Short (%)	19	2	0	14	4	0	10	0	2	6	35	5
Short (%)	31	20	28	24	21	0	40	12	20	21	40	19
Adequate (%)	50	78	71	61	57	63	50	77	67	63	25	75
Surplus (%)	0	0	1	1	18	37	0	11	11	10	0	2

Subsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Very Short (%)	66	44	43	51	32	6	19	38	14	34	55	9
Short (%)	30	40	46	38	37	50	55	46	26	40	33	19
Adequate (%)	4	16	11	11	28	44	26	16	60	26	12	61
Surplus (%)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1

（Week とは Last week を意味し、Year とは Last year を意味する）

小麦進捗状況：

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave
Planted (%)	87	80	76	68	56	59	53	37	34	67	50	77	59
Emerged (%)	65	43	55	20	32	25	13	14	19	37	18	41	29

（Week とは Last week、Year とは Last year をそして Ave は過去 5 年平均を意味する）

Source：Kansas Agricultural Statistics Service