

モンタナ州：小麦作柄と気象状況

2010 年 6 月 27 日現在

概況 モンタナ州の 2010 年 6 月 27 日に終わる 1 週間の気象は、日中の最高気温は平年より多少低目であったが少雨の好天候となった。NC 地区の最高気温は 80～85 度 F であり、1 週間の降水量は 0.02～0.21 インチ、NE 地区の最高気温は 82～93 度 F、1 週間の降水量は 0.07～0.91 インチであった。その他の地区も最高気温は概ね 80 度 F の半ばから 90 度 F、降水量は概ね 0.11～1.06 インチ（SE 地区：0.95～2.22 インチ）であった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.2 日（前週：2.7 日）に改善した。Topsoil の土壌水分は、“Surplus” が減少し、“Adequate” が増加、Subsoil の土壌水分も “Surplus” が減少し、土壌水分状況は昨年並びに平年より良い状態が続いた。冬小麦は順調に出穂し、全体の 59%（昨年：79%、5 年平均：84%）が出穂し、気温の上昇で作柄は改善した。春小麦の生育も昨年より遅く全体の 31% が穂孕み期（昨年：42%、5 年平均：61%）であり、作柄は前週より多少落ちた。2010 年 6 月 1 日付け USDA の 2010 年産冬小麦の生産量予想では、モンタナ州の冬小麦の単位収量は 5 月 1 日予想より 3.0 bushels 増え 43.0 bushels/acre（昨年実績：37.0 bushels/acre）と予想された。生産量予想は収穫予想面積が昨年より 22.5% 減少していることもあり 81,700,000 bushels（昨年比：91.2%）であった。

土壌水分(*)

(%)		Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	3	79	18
	Last week	0	1	64	35
	Last Year	17	39	43	1
	5-yr Ave.	8	26	60	6
Subsoil	This week	1	7	79	13
	Last week	1	7	73	19
	Last Year	12	39	47	2
	5-yr Ave.	9	32	55	4

冬小麦の生育状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5-yr Avg.
Boot stage	94	71	95	97
Headed	59	17	79	84

冬小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	1	1	4	2
Poor	3	4	10	9
Fair	20	23	35	32
Good	50	51	42	40
Excellent	26	21	9	17

春小麦の生育状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5-yr Avg.
Boot	31	18	42	61

春小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	0	0	0	1
Poor	1	1	8	5
Fair	20	18	22	23
Good	61	63	63	61
Excellent	18	18	5	9

(*)Source: National Agricultural Statistics Service, Montana Field Office. 5-yr average means average of 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009 Crop years.

ご質問又はご意見は、OMIC USA Inc. 小川正晃 ogawa.max@omicnet.com までお願い致します。

© Copyright 2009 OMIC USA Inc. All rights reserved.

2010 年 6 月 1 日付け USDA 冬小麦生産量予想

State	Area Harvested 1,000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1,000 bushels	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010
				May 1	June 1		
Montana	2,420	1,900	37.0	40.0	43.0	89,540	81,700
USA	34,485	31,786	44.2	45.9	46.6	1,522,718	1,482,364

以上