

モンタナ州：小麦作柄と気象状況

2010 年 8 月 1 日現在

概況 モンタナ州の 2010 年 8 月 1 日に終わる 1 週間の気象は、驟雨がかったものの概ね全州にて高温・乾燥気象となった。1 週間の降水量は各地にて 0.01 ~ 0.40 インチ程度であり、最多の雨量は NE 地区の Glasgow の 1.25 インチであった。最高気温は各地 92 ~ 98 度 F であった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 6.2 日(前週:5.5 日)であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は、前週より多少減少したが、昨年並びに 5 年平均より良好な状態が続いた。冬小麦の収穫が開始され、全州の 3% (昨年:10%、5 年平均:45%) が収穫された。春小麦は 92% が出穂し、25% が黄熟期となった。春小麦の生育、登熟も平年より遅れていた。冬小麦並びに春小麦の作柄は前週の評価より多少落ちたが、昨年より良い評価であった。

土壌水分(*)

(%)		Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	1	23	72	4
	Last week	0	22	75	3
	Last Year	19	42	38	1
	5-yr Ave.	32	44	23	1
Subsoil	This week	1	21	77	1
	Last week	1	19	78	2
	Last Year	19	46	35	0
	5-yr Ave.	26	43	29	0

冬小麦の生育状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5-yr Avg.
Turning	95	84	94	98
Harvested	3	0	10	45

冬小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	1	0	3	NA
Poor	2	1	11	NA
Fair	15	15	31	NA
Good	59	63	47	NA
Excellent	23	21	8	NA

春小麦の生育状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5-yr Avg.
Headed	92	79	94	98
Turning	25	10	53	80

春小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	0	0	5	9
Poor	2	1	11	13
Fair	19	18	45	33
Good	59	62	32	38
Excellent	20	19	7	7

(*)Source: National Agricultural Statistics Service, Montana Field Office.5-yr average means average of 2005,2006,2007,2008 & 2009 Crop years.

ご質問又はご意見は、OMIC USA Inc.小川正晃 ogawa.max@omicnet.com までお願い致します。

© Copyright 2009 OMIC USA Inc. All rights reserved.

2010 年 7 月 1 日付け USDA 冬小麦生産量予想

State	Area Harvested 1,000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1,000 bushels	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010
				June 1	July 1		
Montana	2,420	2,050	37.0	43.0	43.0	89,540	88,150
USA	34,485	32,085	44.2	46.6	46.9	1,522,718	1,505,493

2010 年 7 月 1 日付け USDA 春小麦生産量予想

State	Area Harvested 1,000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1,000 bushels	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010
				July 1	-		
Montana	2,350	2,750	30.0	31.0	-	70,500	85,250
USA	12,955	13,590	45.1	44.6	-	584,411	606,755

以上