

モンタナ州：小麦作柄と気象状況

2011 年 6 月 12 日現在

概況 モンタナ州の 2011 年 6 月 12 日に終わる 1 週間の気象は、日中の気温は上昇したが平年より低目の気温で多雨の気象であった。各地の最高気温は 70 度の半ばから 80 度半ばであった。最低気温は 33～45 度 F と低かった。1 週間の降水量は Cent 地区では 1.39～3.04 インチ、NE 及び NC 地区では 0.53～2.53 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 1.8 日(前週:2.0 日)であった。多雨が続き各地の圃場の Topsoil の土壌水分は 61%が“Surplus”、Subsoil では 52%が“Surplus”であった。冬小麦の生育は低温・多雨で遅れており、全体の 35% (昨年:58%、5 年平均:70%) が穂孕み期となり、1%が出穂した。春小麦の播種は 83%にて完了し、63%にて出芽した。5 年平均で同時期には播種は完了し、97%が出芽していた。冬小麦の作柄は全体の 67%が“Good”以上であり、多少昨年より低い評価であった。春小麦の作柄は“Good”以上が 44%であり昨年同期(79%)より低い評価であった。

USDA の 6 月 1 日付け 2011 年産冬小麦の生産量予想では、モンタナ州の冬小麦の単収は 5 月 1 日予想より 3.0 bu/acre 増え 47.0 bu/acre(昨年実績:48.0 bu/acre)であり、生産量は昨年より増え 101,050,000 bushels(昨年比 108.0%)であった。増収の理由は収穫面積が昨年より約 1 割増えている為である。

2011 年 6 月 12 日現在：土壌水分(*)

(%)		Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	0	39	61
	Last week	0	0	36	64
	Last Year	0	6	77	18
	5-yr Ave.	3	16	69	12
Subsoil	This week	0	0	48	52
	Last week	0	1	50	49
	Last Year	3	10	76	11
	5-yr Ave.	6	24	63	7

2011 年 6 月 12 日現在：冬小麦の生育状況 (*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr average
Boot stage	35	26	58	70
Headed	1	NA	3	28

2011 年 6 月 12 日現在：冬小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	1	0	1	1
Poor	5	5	4	7
Fair	27	27	23	32
Good	51	55	50	42
Excellent	16	13	22	18

2011 年 6 月 12 日現在：春小麦の生育状況 (*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr average
Planted	83	73	99	100
Emerged	63	50	92	97

2011 年 6 月 12 日現在：春小麦の作柄状況(*)

(%)	This week	Last week	Last year	5 yr Avg.
Very poor	1	NA	0	1
Poor	3	NA	1	3
Fair	52	NA	20	26
Good	37	NA	63	58
Excellent	7	NA	16	12

(*)Source: National Agricultural Statistics Service, Montana Field Office.5-yr average means average of 2006,2007,2008,2009 & 2010 Crop years.

2011 年 6 月 1 日付け USDA 生産量予想

State	Area Harvested 1000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1000 bushels	
	2010	2011	2010	2009		2010	2011
				May 1	June 1		
Montana	1,950	2,150	48.0	44.0	47.0	93,600	101,050
USA	31,749	37,039	46.8	44.5	45.3	1,485,236	1,450,115

以上