

## モンタナ州：小麦作柄と気象状況

2003 年 5 月 20 日

2003 年 5 月 18 日現在：

前週程ではないが各地に降雨があり、5 月 18 日に終わる 1 週間の州平均農作業日数は、4.2 日（前週：1.2 日）であった。北中央地区の 1 週間の降水量は 0.05 ～0.91 インチであった。気温は前週より上昇した。最高気温は北中央地区（NC）で 70～80 度 F、北東地区（NE）では 76～80 度、中央地区（C）では 72～80 度 F となった。土壌水分は更に改善され、Topsoil 並びに Subsoil の水分は、共に昨年並びに過去 5 年平均より良好な状態を保った。

冬小麦の作柄状況は、Very poor:2%、Poor:4%、Fair:17%、Good:59%、Excellent:18%の評価であり、前週とほぼ同水準を保った。作柄は昨年及び平年に比し良好である。9%の小麦が穂孕み期に入った。前週に引き続き低温・湿潤な気象の為、北中央地区（NC）にて Streak mosaic(すじモザイク病)の発生が報告された。春小麦の播種は 74%の圃場にて完了した（昨年同期：67%、平年：84%）。春小麦の 39%が出芽した。昨年より早い進捗である。

## 土壌水分状況：

|             | This week | Last week | Last year | 5-year Avg. |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Topsoil (%) |           |           |           |             |
| Very short  | 0         | 0         | 25        | 25          |
| Short       | 7         | 5         | 34        | 36          |
| Adequate    | 82        | 71        | 40        | 36          |
| Surplus     | 11        | 24        | 1         | 3           |
| Subsoil (%) |           |           |           |             |
| Very short  | 10        | 11        | 46        | 32          |
| Short       | 20        | 24        | 35        | 36          |
| Adequate    | 68        | 62        | 19        | 30          |
| Surplus     | 2         | 3         | 0         | 2           |

## 冬小麦作柄状況：

|               | This week | Last week | Last year | 5-year Avg. |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Very poor (%) | 2         | 1         | 32        | 12          |
| Poor (%)      | 4         | 5         | 29        | 20          |
| Fair (%)      | 17        | 19        | 29        | 39          |
| Good (%)      | 59        | 56        | 9         | 25          |
| Excellent (%) | 18        | 19        | 1         | 4           |

## 春小麦進捗状況：

|             | This week | Last week | Last year | 5-year Ave. |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Planted (%) | 74        | 61        | 67        | 84          |
| Emerged (%) | 39        | 23        | 17        | 48          |

Source: Montana Agricultural Statistics Service

モンタナ州小麦作付面積：USDA2003 年 3 月 1 日発表

冬小麦の作付け増加と破棄圃場の減少見込みより、春小麦（HRS）の播種面積は

減少すると見込まれた。

|              | Area Planted 1000 acres |           |           |           |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2001 Crop               | 2002 Crop | 2003 Crop | 2003/2002 |
| Winter wheat | 1,300                   | 1,450     | 1,850     | 128%      |
| Durum wheat  | 510                     | 590       | 600*      | 102%      |
| HRS wheat    | 3,550                   | 3,750     | 3,100*    | 83%       |

\*2003年3月31日予想

当該作物レポートに関するご質問、お問い合わせは下記宛てにお願い致します。

小川正晃：E-mail [ogawa.max@omicnet.com](mailto:ogawa.max@omicnet.com)