

ノース・ダコタ州：小麦作柄と気象状況

2010 年 8 月 22 日

概況：ノースダコタ州の 2010 年 8 月 22 日に終わる 1 週間の気象は、高温・乾燥気象となった。各地の最高気温は 91～101 度 F となり、1 週間の降水量は殆どの観測所にて 0.00 インチであったが、降雨を記録した NE 地区の観測所でも 0.22 インチが最高降水量であった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 6.4 日（前週：4.4 日）となった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は前週より乾燥し “Adequate” が減り “Short” が増えたが、5 年平均より良い状態であった。高温・乾燥気象により硬質春小麦は急速に枯熟し収穫が捗り、全体の 53% が収穫された。Durum 小麦は 88% が黄熟期となり、全体の 19% が収穫された。硬質春小麦の作柄は前週より評価が上がった。小麦の完熟並びに収穫は昨年より早く進展していた。Durum 小麦の作柄は多少前週より評価が落ちた。昨年は下回っていたが、5 年平均より良いとの報告であった。

土壌水分(*)

(%)		Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	1	28	66	5
	Last week	0	15	76	9
	Last year	0	23	73	4
	5-Yr Avg.	12	25	60	3
Subsoil	This week	1	19	71	9
	Last week	1	14	76	9
	Last year	1	20	74	5
	5-Yr Avg.	14	26	57	3

春小麦の生育状況(*)

(%)		This week	Last week	Last year	5-yr. Average
Spring Wheat	Turning	96	90	85	97
	Harvested	53	27	6	55
Durum wheat	Turning	88	59	80	92
	Harvested	19	3	4	38

春小麦の作柄状況(*)

Hard Red Spring	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week (%)	0	2	15	67	16
Last week (%)	1	2	15	68	14
Durum Wheat					
This week (%)	1	1	12	83	3
Last week (%)	0	1	13	83	3

(*) Source: USDA, NASS North Dakota Office. 5-yr average means 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009 crop average.

USDA 8月1日付け硬質春小麦の生産量予想：

State	Area Harvested 1,000 acres		Yield Bushels/acre			Production 1,000 bushels	
	2009	2010	2009	2010		2009	2010
				July 1	Aug 1		
N. Dakota	6,300	6,550	46.0	43.0	46.0	289,800	301,300
USA	12,955	13,590	45.1	44.6	46.6	584,411	633,245

以上