

ネブラスカ州：小麦作柄と気象状況

2003 年 8 月 12 日

2003 年 8 月 10 日現在：

ネブラスカ州の気象は、その後も平均気温が高く作物に水分不足のストレスを起こしている。冬小麦の品質は、製粉歩留まりは昨年並か多少昨年より低いとの報告があった。

8 月 1 日付け USDA の冬小麦生産量予想では、単位収量が 7 月 1 日予想より 2.0bu/acre 増加した。6 月中～下旬の降雨が良い結果を生んだと言える。

2003 年 4 月 1 日から 8 月 10 日までの降水量（インチ）：

	NW	NC	NE	CEN	EC	SW	SC	SE
Past week	0.24	0.65	0.79	0.92	0.30	1.47	0.45	0.07
Total since 4/1/03	9.90	13.07	15.22	14.71	14.05	13.19	13.25	15.30
Normal	10.69	12.98	14.76	14.03	15.43	12.52	13.83	15.91
Total as % of normal	92%	101%	103%	105%	91%	104%	96%	96%

8 月 1 日付け農務省発表の冬小麦生産量予想：

	Area Harvested 1000 Acres		Yield Bushels/Acre			Production 1000 Bushels	
	2002	2003	2002	2003		2002	2003
				July 1	Aug 1		
Nebraska	1,520	1,700	32.0	47.0	49.0	48,640	83,300

ネブラスカ州冬小麦作付面積：USDA2003 年 3 月 1 日発表

	Area Planted 1000 acres			
	2001 Crop	2002 Crop	2003 Crop	2003/2002
Winter wheat	1,750	1,650	1,750	106%

2003 年産小麦品種：<http://www.nass.usda.gov/ne/variety/whet2003.pdf> 同ページに作付け品種の明細が掲載されています。

2003 年産冬小麦の品種（上位 5 品種）は、Alliance（196,000 エーカー）が昨年に続き第 1 位にあり、続いて Pronghorn（175,000 エーカー）、2137（175,000 エーカー）、Arapahoe（148,000 エーカー）そして 5 位が Buckskin（125,000 エーカー）であった。昨年は 215,000 エーカー作付けられた Arapahoe は 2003 年では第 4 位となった。尚、Hard White Wheat の作付けは全体の凡そ 2%（2003 年産：0.2%）と発表された。

当該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃：Email ogawa.max@omicnet.com