

ネブラスカ州：小麦作柄と気象状況

2003 年 4 月 22 日

2003 年 4 月 20 日現在：

4 月 20 日に終わる 1 週間の平均気温は、概ね平年並であったが、所により平年を 5 度 F 程上回った。降水が各地に有り、1 週間の降水量計は 0.30 インチから多い所で 1 インチ以上を記録した。土壌水分は Topsoil 並びに Subsoil とともに昨年より良い状態と成った。

冬小麦の作柄状態は引き続き改善され、Very poor:1%、Poor:11%、Fair:44%、Good:39%、Excellent:5%となった。

4 月 20 日現在で全州の冬小麦の 13%が Jointing stage に入った。昨年及び平年（5 年平均）より早い進捗である。

2003 年 4 月 1 日から 4 月 20 日の降水量（インチ）：

	NW	NC	NE	CEN	EC	SW	SC	SE
Past week	0.79	1.23	0.81	0.88	0.30	1.28	0.59	0.64
Total since 4/1/03	1.17	1.87	1.56	2.20	1.50	1.98	1.46	1.48
Normal	1.13	1.35	1.63	1.55	1.76	1.20	1.33	1.79
Total as % of normal	103%	138	96	141	85	165	107	82

小麦作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter Wheat %	1	11	44	39	5
Last week	5	15	37	40	3

小麦生育状況：（数値は全圃場に対するパーセント）

	NW	NC	NE	C	EC	SW	SC	SE	State	Week	Year	Ave.
Jointed	10	11	2	10	12	17	12	10	13	2	8	10

Week: last week, Year: last year, Ave.: 5 years average

土壌水分：

	NW	NC	NE	C	EC	SW	SC	SE	State	Week	Year	Ave.
Topsoil %												
Very short	0	3	15	0	6	14	3	17	6	11	28	11
Short	11	11	23	50	31	25	41	27	22	36	32	17
Adequate	88	86	52	47	62	59	56	56	70	53	40	62
Surplus	1	0	10	3	1	2	0	0	2	0	0	10
Subsoil %												
Very short	27	32	32	40	35	56	49	57	38	45	20	14
Short	54	39	43	49	44	37	45	34	44	44	46	26
Adequate	19	29	24	11	21	7	6	9	18	11	34	56
Surplus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Week: last week, Year: Last year, Ave.: 5 years average を意味する。

Source: Nebraska Agricultural Statistics Service

ネブラスカ州冬小麦作付面積：USDA2003年3月31日発表（次ページ）

	Area Planted 1000 acres			
	2001 Crop	2002 Crop	2003 Crop	2003/2002
Winter wheat	1,750	1,650	1,750	106%

2003年産冬小麦の品種（上位5品種）は、Alliance（196,000エーカー）が昨年に続き第1位にあり、続いてPronghorn（175,000エーカー）、2137（175,000エーカー）、Arapahoe（148,000エーカー）そして5位がBuckskin（125,000エーカー）であった。昨年は215,000エーカー作付けられたArapahoeは2003年では第4位となった。尚、Hard White Wheatの作付けは全体の凡そ2%（2003年産：0.2%）と発表された。

当該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃：Email ogawa.max@omicnet.com