

カリフォルニア州： 気象と状況と米の作柄概況

2002 年 8 月 13 日

2002 年 8 月 11 日現在：

過去 1 週間のサクラメント盆地の気象は、地域的に気温が平年を下回った。出穂期に入った水田も有るが、夜間の低温で進捗は遅れている。全般に稲の生育は順調である。開花中の夜間の低温（50 度 F=11 度 C 以下）は不稔（blank）を生ずる恐れがあるが、収穫期を迎えないと被害の状況は判明しない。稲の状態は Poor:0%（前週：5%）、Fair:55%（前週 45%）、Good:45%（前週 40%）、excellent:0%（前週：10%）と成っている。8 月 11 日現在、全水田の 40%が出穂している（昨年：46%、平年：38%）。

今年の播種は、3 月及び 4 月の天候が良かった事で、平年より約週間早く開始されたが、その後の気温が低かった事もあり生育の速さは略平年並みと成っている。

8 月 1 日 USDA 予想では、カリフォルニア米（短・中・長粒計）作付面積は 510,000 エーカー、収穫予想面積は 508,000 エーカー、単位収量：8,100 ポンド（昨年：8,170 ポンド）、収穫量は 41,148,000 ブッシェル（昨年：38,490 千 Bu）と予想している。

生育状況：

	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Headed (%)	40	20	46	38

参考：南部米生育概況：

Harvested (%)	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Arkansas	0	0	2	0
Louisiana	45	31	38	42
Mississippi	0	0	0	0
Missouri	0	0	0	0
Texas	64	38	36	30

ルイジアナ州では 31%、テキサス州では 38%の水田で収穫が完了した。

カリフォルニア米作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
California	0	0	55	45	0

Sources: California Agricultural Statistics Service; Cooperative Extension, University of California

当該作柄レポートへのご質問又はご意見は下記にお願い致します。

OMIC USA Inc., Portland Oregon

小川正晃

Email: ogawa.max@omicnet.com