

カリフォルニア州： 気象と状況と米の作柄概況

2002 年 7 月 16 日

2002 年 7 月 14 日現在：

略サクラメント盆地の水田に於ける除草剤の散布作業は終了した。主たる農作業であった。サクラメント盆地の気象は良好であり、稲の生育に問題は発生していない。稲は穂孕み期の後期にあり出穂直前である。早生種を栽培しているサクラメント盆地の北部では、一部開花期に入った稲も有る。7 月水管理が重要な時期となる。70%の水田の稲が“good”、5%が“excellent” の評価である。灌漑用水は十分な状況である。

カリフォルニア米作付面積 (1,000 エーカー)

	Long Grain	Medium	Short	Total
2001/02 crop	13	435	25	473
2002/03 crop	10	455	20	485

2002/03 年産は 2002 年 4 月 USDA 予想

生育状況：

	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Headed (%)	0	0	9	2

参考：南部米生育概況：

Headed (%)	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Arkansas	8	3	11	9
Louisiana	80	67	66	62
Mississippi	15	6	23	23
Missouri	3	0	1	2
Texas	83	70	67	64

米作柄：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
California	0	0	25	70	5

Sources: California Agricultural Statistics Service; Cooperative Extension, University of California

当該作柄レポートへのご質問又はご意見は下記にお願い致します。

OMIC USA Inc., Portland Oregon

小川正晃

Email: ogawa.max@omicnet.com