

カリフォルニア州： 気象と状況と米の作柄概況

2002 年 7 月 23 日

2002 年 7 月 21 日現在：

7 月 21 日までの 1 週間のサクラメント盆地の気象は各地で最高気温が 100 度を越す高温を記録した。特に北部では 110 度近くになった個所もある。稲は昨年より遅れているが、平年(5 年平均)より多少早く出穂を開始した。7 月 21 日現在全水田の 5%が出穂している(平年 3%、昨年 13%)。高温は多少稲の生育状況を悪くした。早生種を栽培しているサクラメント盆地の北部では、一部開花期に入った稲も有るが、この高温が襲う前であり特に被害は無かった模様との現地 USDA 農業普及員の話である。7 月中・下旬は水管理が重要な時期となる。稲は fair:35% (前週 25%)、good:65% (前週 70%)、excellent:0% (前週 5%) と評価されている。

カリフォルニア米作付面積 (1,000 エーカー)

	Long Grain	Medium	Short	Total
2001/02 crop	13	435	25	473
2002/03 crop	10	455	20	485

2002/03 年産は 2002 年 4 月 USDA 予想

7 月 12 日 USDA 予想では、カリフォルニア米(短・中粒計)作付面積は 510,000 エーカーと 4 月予想より 25,000 エーカー増加している。

生育状況：

	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Headed (%)	5	0	13	3

参考：南部米生育概況：

Headed (%)	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Arkansas	23	8	32	18
Louisiana	84	80	78	75
Mississippi	39	15	40	35
Missouri	7	3	4	4
Texas	92	83	83	76

カリフォルニア米作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
California	0	0	35	65	0

Sources: California Agricultural Statistics Service; Cooperative Extension, University of California

当該作柄レポートへのご質問又はご意見は下記にお願い致します。

OMIC USA Inc., Portland Oregon

小川正晃

Email: ogawa.max@omicnet.com